

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Een bruine 9-jarige Jazz ruin komt vorig jaar november bij mij in de praktijk met de klacht dat hij al sinds meer dan een jaar een veel kortere pas maakt in stap met het rechterachterbeen. De eigenaresse is via haar eigen dierenarts met het paard in een tweede lijn kliniek geweest, waar het paard volledig is uitverdoofd, geröntgend en door de scintigrafie is geweest.

Er wordt geen oorzaak gevonden voor de verkorte pas in het onderbeen of bovenbeen. Langdurige rust en pijnstillers geven geen verbetering. Het paard laat bij mij de korte pas van het rechterachterbeen duidelijk zien, op de volte in stap nog meer dan rechtuit. Uiterlijk is geen bekkenscheefstand vast te stellen. Door manueel onderzoek vind ik een blokkade en pijn in het rechter SI gewricht. Na behandeling en acupunctuur wordt het paard eerst een maand gelongeerd. In februari 2010 doe ik een herhalingsbehandeling, waarbij het al duidelijk beter gaat. In juni is het paard zo goed als symptoomvrij en start weer ZZ.


Een 5-jarige Friese merrie heeft als 3- en 4-jarige twee veulens gehad. Na het tweede veulen is in november 2009 het paard beleerd, zonder enige klachten, door een professionele amazone. Stap, draf en galop kan het paard probleemloos. Het paard is voor de winter naar huis gegaan en daar gelongeerd door de eigenaar. Daarbij is het paard een keer onderuit gegaan tijdens het longeren, vanwege gladheid.

Eind april is het paard teruggegaan naar de amazone om klaar te worden gemaakt voor de IBOP. Het paard maakt linksachter een duidelijk kortere pas en wil niet meer in galop.

Bij doorrijden wordt het paard zelfs kreupel. De amazone voelt nu dat zij steeds scheef zakt, wat voorheen nooit het geval was. Kreupelheidsonderzoek van de benen levert niets op. Het bekken is duidelijk scheef van achteraan-zicht en van bovenaanzicht. Het paard wordt behandeld met manuele therapie en een longeschema van 3 weken. Dan volgt een controle en een herhalingsbehandeling. Het paard zal waarschijnlijk nooit meer helemaal recht worden, maar naar verwachting wel weer kunnen functioneren.

Een 4-jarige schimmelmerrie, door de eigenaar zelf gefokt, was altijd recht van lijf en leden en kon goed lopen. De merrie heeft met zeer goed gevolg een EPTM test gelopen. Daarna heeft zij een veulen gehad. Sindsdien is het paard rechtsachter onregelmatig. Van achter gezien is het duidelijk scheef: de beide Tuber Coxae staan niet recht tegenover elkaar. Het paard wordt behandeld, het bekken wordt weer beweeglijk gemaakt, de scheefstand is iets te verbeteren. Normaal gesproken zal hierdoor de onregelmatigheid na enkele weken verdwijnen, maar er is weinig tijd, want ze mag naar de centrale keuring...

Schimmelmerrie, van bovenaf gezien duidelijk scheef.



Friese merrie met scheef bekken



Wie?



Dit artikel werd geschreven door:

Rodinde Hoogenraad
Noordwolderweg 5
8393 RC Vinkega (FR)
0561-433 333
www.paardenkliniekvinkega.nl

Vianenstraat 6A
5437 PG Beers
06-54312822

In oktober zal Rodinde ons meer vertellen over kreupelheden en rugproblemen bij paarden.